

Supplementary data

Table 1 Fatty acid composition of fetal bovine serum (relative %)

Fatty acid	relative (%)	Fatty acid	relative (%)
6 : 0	0,00	18 : 2 <i>n</i> -6	4,69
8 : 0	0,00	18 : 3 <i>n</i> -6	0,07
10 : 0	0,00	20 : 2 <i>n</i> -6	0,59
12 : 0	0,00	20 : 3 <i>n</i> -6	1,95
14 : 0	1,29	20 : 4 <i>n</i> -6 (AA)	6,24
15 : 0	0,88	22 : 4 <i>n</i> -6	0,85
16 : 0	23,96	22 : 5 <i>n</i> -6	0,03
17 : 0	1,08	24 : 2 <i>n</i> -6	0,08
18 : 0	12,55	18 : 3 <i>n</i> -3	0,47
20 : 0	0,43	18 : 4 <i>n</i> -3	0,32
22 : 0	1,41	20 : 3 <i>n</i> -3	0,19
23 : 0	0,10	20 : 5 <i>n</i> -3	0,86
24 : 0	1,12	22 : 3 <i>n</i> -3	0,12
16 : 1 <i>n</i> -7	2,97	22 : 5 <i>n</i> -3 (EPA)	2,81
18 : 1 <i>n</i> -9	20,63	22 : 6 <i>n</i> -3 (DHA)	4,09
18 : 1 <i>n</i> -7	6,41	16 : 1 <i>n</i> -7tr	0,29
20 : 1 <i>n</i> -9	0,38	18 : 1tr	0,41
20 : 3 <i>n</i> -9	0,09	14 : 1 <i>n</i> -x	0,06
22 : 1 <i>n</i> -9	0,07	16 : 0dma	0,50
24 : 1 <i>n</i> -9	1,84	22 : 2 <i>n</i> -x	0,16